

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH,
SUPAÉRO (ISAE), ENSTA PARISTECH,
TÉLÉCOM PARISTECH, MINES PARISTECH,
MINES DE SAINT-ÉTIENNE, MINES DE NANCY,
TÉLÉCOM BRETAGNE, ENSAE PARISTECH (FILIÈRE MP),
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI).

CONCOURS 2015

PREMIÈRE ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES I - MP

Filière MP

Extrait

B. Théorème d'approximation de Weierstrass

Soit n un entier strictement positif, $x \in [0, 1]$ et $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On note $X_1, X_2, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes et distribuées selon la loi de Bernoulli de paramètre x . On note également $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, $Z_n = \frac{S_n}{n}$ et $B_n(f)(x) = E(f(Z_n))$.

- 5) Rappeler, sans démonstration, la loi de S_n . En déduire, avec démonstration, les valeurs de l'espérance et de la variance de S_n en fonction de n et de x .
- 6) En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que pour tout $\alpha > 0$:

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \alpha}} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n\alpha^2}$$

- 7) Montrer que :

$$B_n(f)(x) - f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right)$$

Fin extrait

Soit n un entier strictement positif, $x \in [0, 1]$ et $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On note $X_1, X_2, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes et distribuées selon la loi de Bernoulli de paramètre x . On note également $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, $Z_n = \frac{S_n}{n}$ et $B_n(f)(x) = E(f(Z_n))$.

5) Rappeler, sans démonstration, la loi de S_n . En déduire, avec démonstration, les valeurs de l'espérance et de la variance de S_n en fonction de n et de x .

5)

i) $S_n \sim B(n, x)$

ii) $E(S_n) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$

$$= \sum_{i=1}^n E(X_i) \quad (\text{linéarité de l'espérance})$$

$$= \sum_{i=1}^n x \quad (X_i \sim B(x) \Rightarrow E(X_i) = x)$$

$$= nx$$

iii) $V(S_n) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$

$$= \sum_{i=1}^n V(X_i) \quad (X_1, \dots, X_n \text{ indépendantes})$$

$$= \sum_{i=1}^n x(1-x) \quad (X_i \sim B(x) \Rightarrow V(X_i) = x(1-x))$$

$$= nx(1-x)$$

6) En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que pour tout $\alpha > 0$:

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \alpha}} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n\alpha^2}$$

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \alpha}} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \alpha}} P(S_n = k) \quad \left(\text{car } S_n \sim B(n, x) \right)$$

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

Rappel : $\sum_{k \in A} P(X = k) = P(X \in A)$

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \alpha}} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \alpha}} P(S_n = k)$$

$$= P\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \alpha\right)$$

$$= P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E\left(\frac{S_n}{n}\right)\right| \geq \alpha\right) \quad \left(\begin{array}{l} \text{Car} \\ E(S_n) = nx \end{array} \right)$$

$$\leq \frac{V\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\alpha^2} \quad \left(\text{Inég de B-Tchb} \right)$$

$$= \frac{1}{n^2 \alpha^2} V(S_n)$$

D'où :

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |\frac{k}{n} - x| \geq \alpha}} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{n(1-x)}{n \alpha^2} \quad \left(V(S_n) = n x(1-x) \right)$$

Pour arriver à $\frac{1}{4n\alpha^2}$, il suffit de vérifier

que $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$. Ce qui est vrai car :

$$\frac{1}{4} - x(1-x) = x^2 - x + \frac{1}{4} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0.$$

□

7) Montrer que :

$$B_n(f)(x) - f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right)$$

D'où :

$$B_n(f)(x) - f(x) = E\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) - f(x)$$

$$= E\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) - f(x)$$

$$= \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) P(S_n = k) - f(x) \quad \left(\begin{array}{l} \text{formule} \\ \text{du transfert} \end{array} \right)$$

$$= \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) P(S_n = k) - f(x) \cdot \underbrace{\sum_{k=0}^n P(S_n = k)}_{=1}$$

$$= \sum_{k=0}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) P(S_n = k)$$

$$= \sum_{k=0}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

□